

Résultats cancérologiques inquiétant et risques du vaccin Gardasil

Gérard Delépine Chirurgien cancérologue
gerard.delepine@bbox.fr

Les auteurs déclarent qu'ils n'ont aucun lien avec une entreprise du médicament

Antibes

4 novembre 2023


Nicole et Gérard Delépine

Hystérie vaccinale

Gardasil et cancer : un paradoxe



Exceptionnelle cause de décès par cancer en France



En France, il est responsable **de 0,15% de la mortalité globale et de 0,6% de la mortalité par cancer** avec une mortalité de 1,8/100000

Les 1000 décès annuels qui lui sont imputables **touchent dans près 80% les femmes qui ne se font pas dépister** selon les recommandations (**1 fois / 3 ans à partir de 25 ans**)

Aucun essai randomisé n'a évalué l'effet du Gardasil sur le risque de cancer invasif !

Merck ne voulait pas investir le temps ni l'argent nécessaires pour effectuer des tests qui prouveraient que son vaccin prévenait le cancer du col de l'utérus. Merck a persuadé les régulateurs de l'autoriser à utiliser des « **paramètres de substitution** » pour étayer sa théorie selon laquelle les vaccins contre le VPH seraient efficaces dans la prévention du cancer du col de l'utérus.

L'utilisation de ces paramètres de substitution a permis à Merck de raccourcir les essais cliniques et **d'obtenir les approbations réglementaires pour les vaccins sans aucune preuve que les vaccins préviendraient le cancer à long terme.**

Les patients, les médecins et les parents auraient dû recevoir des informations précises sur les avantages et les effets secondaires du Gardasil.

17 ans après la mise sur le marché rien n'a démontré formellement une efficacité anticancéreuse du Gardasil ! Revoyons les faits avérés.

Le ministère et les médias citent en exemple l'Australie et prétendent que

“la vaccination va bientôt éradiquer le cancer

C'est un mensonge total !




Significant events in human papillomavirus (HPV) vaccination practice in Australia

Year	Month	Intervention
2006	June	4-valent human papillomavirus vaccine (4vHPV) registered for use in females aged 9–26 years as a 3-dose schedule
2007	March	2-valent human papillomavirus vaccine (2vHPV) registered for use in females aged 10–45 years as a 3-dose schedule
2007	April	A 3-dose schedule of HPV recommended for females aged 12–26 years
	April	A 3-dose schedule of 4vHPV funded for females aged 12–13 years, delivered through a school-based program
	July	Time-limited catch-up program of a 3-dose schedule of 4vHPV delivered through schools or primary care providers targeting females aged 14–26 years

Incidence, by sex, 1982 to 2019



Cancer type: Cervix



Depuis le Gardasil le nombre de cancers invasifs augmente


Australia cervix cancer incidence trend in the most vaccinated group



In 2006 113 cases incidence 7,9/100000.

In 2019 172 cases incidence 9,1/100000 (+15%)

Figure 1: Cervical cancer, incidence counts and age-specific rates, females, 25-34 years



Depuis le Gardasil, **dans le groupe des femmes 25-34 ans, les plus vaccinées**, le nombre annuel de cancers du col de l'utérus est passé de 113 à 172 (+52%) et **l'incidence a augmenté de 15% (de 7,9 à 9,1)**

L'Australie est bien loin d'éradiquer le cancer du col !



Evolution d'incidence des cancers invasifs du col (0-85)

Cervical Cancer (C53), European Age-Standardised Incidence Rates, Females, UK, 1993 to 2018

Le Monde

Se connecter

ACTUALITES

Le monde ment!


SCIENCE

Au Royaume-Uni, la fréquence des cancers du col de l'utérus a chuté de 87 % grâce à la vaccination anti-HPV

L'impact majeur de la vaccination contre les papillomavirus a été démontré dans ce pays, où la couverture vaccinale dépasse 80 % chez les adolescentes. En France, elle atteint à peine 28 % chez les jeunes filles de 16 ans.


Par Florence Rosier
Publié le 09 novembre 2021 à 06h00, modifié le 09 novembre 2021 à 09h22 - Lecture 4 min.

Ceux qui prétendent que la vaccination est en train d'éradiquer le cancer du col utérin en Grande Bretagne mentent!



*“In England, United Kingdom, researchers found that the HPV immunization programme **has almost eliminated cervical cancer in women born since 1 September 1995** (who were vaccinated at age 12–13).”*

Cervical Cancer (C53), European Age-Standardised Incidence Rates per 100,000 Female Population, By Age, UK, 1993-2018





Dans le groupe des 25-34 ans l'incidence a augmenté de 17%

Dans le groupe des plus jeunes (<25 ans) l'incidence est stable




Finland incidence of invasive cervical cancer (0-85)




Grace au dépistage cytologique l'incidence des cancers invasifs avait diminué de 80%. Depuis la vaccination scolaire l'incidence a augmenté



Finlande incidence des cancers invasifs selon l'âge




l'incidence a augmenté de 72% dans le groupe le plus vacciné(25-34)



L'incidence diminue dans le groupe des femmes plus âgées (non vaccinées)



Norway incidence of invasive cervical cancer(0-85)



Dépistage seul diminution de 40%


Ere de la vaccination
augmentation

Avant la vaccination, l'incidence a diminué de près de 40% grace au dépistage. Depuis la vaccination, l'incidence des cancers invasifs augmente .



Norvège : dans le groupe le plus vacciné l'incidence augmente depuis le Gardasil


Age-Standardized Rate (World) per 100 000



Les femmes âgées de 25 à 34 ans en 2021 ont subi une augmentation d'incidence de 30% depuis la vaccination!




Suède incidence des cancers invasifs (0-85)



Avant la vaccination, l'incidence a diminué de 60% grâce au dépistage.
Depuis la vaccination, l'incidence des cancers invasifs augmente

FRANCE: INCIDENCE D'APRÈS SANTÉ PUBLIQUE FRANCE



D'après l'OMS une incidence de 6/100000 définit une maladie rare

L'incidence standardisée monde du cancer du col est plus basse en France peu vaccinée que dans les pays qui ont organisé des vaccinations scolaires

France : 6/100000

Australie : 7,1

Grande Bretagne : 9,3

Suède : 10,4

Norvège : 12

Alors pourquoi instaurer une telle vaccination?

Hypothèses pouvant expliquer l'effet cancérologique paradoxal du Gardasil

En supprimant certaines souches de HPV, les vaccins Gardasil créent une niche écologique favorable aux autres souches possiblement plus agressives ou favoriser des modifications mutagénétiques du virus

La propagande prétendant que le Gardasil protégerait du cancer du col incitent les vaccinées à délaissé le dépistage pourtant le seul moyen dont l'efficacité est prouvée !



En GB depuis dix ans de moins en moins de femmes vaccinées se font dépister


Faudrait-il vacciner les garçons par Gardasil?

Pour doubler le marché du Gardasil en l'injectant aux garçons les firmes tentent d'effrayer les parents avec **les cancers de l'anus**.


Mais **ce cancer est exceptionnel** chez les Français (360 cas annuels)
Il se traite efficacement et tue très peu (une centaine de morts/an)
Il touche presque exclusivement les hommes homosexuels passifs
surtout s'ils sont immunodéprimés en particulier par **le sida**.

Pour un **homme hétérosexuel non immunodéprimé le risque de cancer anal est presque nul et bien inférieur au risque de complication vaccinale** d'autant que **le Gardasil ne parait pas pouvoir prévenir le cancer anal**

Le Gardasil ne protège pas du cancer anal !



Cancer anal (C21), taux d'incidence européens standardisés selon l'âge, Royaume-Uni, 1993 à 2018



Dans ces deux pays précurseurs de la vaccination scolaire des filles, **le cancer anal a beaucoup plus augmenté chez les filles que chez les garçons !**

Le prix exorbitant du Gardasil explique-t-il sa promotion?

La fabrication d'une dose de Gardasil revient à moins d'un euro. En France elle est vendue plus de 120 euros alors que l'Infanrix Tetra[®] qui protège contre 4 maladies ne coute que 14,63 €.

Le remboursement par la sécurité sociale et la fixation du **prix ont été décidés par le ministre avant même qu'il ne consulte la commission** qui en est normalement chargée.

En 2022 L'action Merck & Co a augmenté de 21,33% grâce au Keytruda et au Gardasil.

Au 2ème trimestre 2023 les ventes de Gardasil ont bondi de 47 % pour atteindre **2,5 milliards de dollars!**

Cette **manne financière colossale donne à Merk les moyens de convaincre** les agences de santé, l'INCA, les sociétés savantes, et les politiques de promouvoir voire d'imposer son vaccin.



le Gardasil n'est pas exempt de complications

Aucun médicament actif n'est exempt de risques. La doxa officielle affirme que ce vaccin est efficace et sans danger comme elle affirmait jadis que les *transfusions sanguines étaient sûres*, que le *nuage de Tchernobyl avait épargné la France* ou plus récemment que *les injections covid étaient efficaces dans plus de 95% des cas*.

Mais alors pourquoi différents pays comptabilisent de nombreuses complications et que des manifestations de victimes ont lieu dans le monde entier?

Complications rapportées :

- Epilepsie
- Paralysie
- Syndrome de Guillain-Barre
- Coma
- Paralysie faciale
- Thromboses
- Uvéite
- Choc anaphylactique
- Avortement spontané
- Décès

Le Gardasil peut tuer !

L'adolescent nantais victime d'un malaise après une vaccination contre le papillomavirus est décédé

LIARS, avant toute enquête, affirme : ce décès « est sans lien avec le produit vaccinal ou à un défaut de qualité du vaccin. »

Pourtant une chose est sûre : ce garçon, en parfaite santé avant la vaccination serait encore en vie s'il n'avait pas été vacciné!

EVENTS REPORTED TO VAERS AFTER HPV VACCINES THROUGH DEC 14, 2019

Event	Female	Male	Unknown	Totals
Disabled	2869	141	82	3092
Deaths	392	31	100	523
Did Not Recover	11,801	996	275	13,072
Abnormal Smear	688	1	6	695
Cervical Cancer	180	0	6	186
Infertility	52	1	0	53
Life Threatening	897	88	16	1,001
Emergency Room	13,664	1,581	174	15,419
Hospitalization	5,956	379	113	6,448
Extended Hospital Stay	285	18	1	304
Serious	8,692	529	276	9,497
TOTAL REPORTS	45,235	7,599	11,436	64,270

Réactions allergiques et anaphylaxie

Les accidents allergiques ont été les premières complications reconnues, parfois mortelles. L'incidence de l'anaphylaxie post Gardasil atteint 2.6/100 000 doses. Soit 26 fois plus qu'après le vaccin anti meningocoque C (risque évalué à 0,1/100000 doses lors de la campagne de vaccination scolaire de 2003).



Brotherton JM, Gold MS, Kemp AS, McIntyre PB, Burgess MA, Campbell-Lloyd S; New South Wales Health HPV Adverse Events Panel. Anaphylaxis following quadrivalent human papillomavirus vaccination. CMAJ. 2008 Sep 9;179(6):525-33. doi: 10.1503/cmaj.080916. Epub 2008 Sep 1. PMID: 18762618; PMCID: PMC2527382.

Uvéite post gardasil

Une recherche sur MEDLINE utilisant les mots clefs "uveitis," "iritis," "iridocyclitis," "human papilloma virus," "Cervarix", and "Gardasil."

A permis de retrouver 24 cas d'uveites survenues après Gardasil, toutes chez des femmes d'âge médian 17 ans, après un intervalle médian de 30 jours (range 0-476 days).

Selon l'OMS une relation causale est possible compte tenu du délai vaccination-uvéite. Les médecins doivent être prévenus qu'une uvéite bilatérale est possible après vaccination par Gardasil



Maladies démyélinisantes post Gardasil

“Nous rapportons cinq observations de patientes qui ont souffert de maladies neurologiques multifocales ou de syndromes démyélinisants atypiques dans les 3 semaines qui ont suivi une vaccination par Gardasil

La temporalité de l’association vaccin –atteinte neurologique pourrait être expliquée par les propriétés immuno-stimulatrices des antigens vaccinaux.

Des études complémentaires sont indispensables pour mieux comprendre le phénomène et voir si certaines personnes y seraient davantage exposées.”



Sutton I, Lahoria R, Tan I, Clouston P, Barnett M. CNS demyelination and quadrivalent HPV vaccination. *Mult Scler.* 2009 Jan;15(1):116-9. doi: 10.1177/1352458508096868. Epub 2008 Sep 19. PMID: 18805844.

Guillain Barré post Gardasil

69 cas de Guillain-Barré Syndrome ont été signalés au VAERS entre 2006 et 2009 le plus souvent (70% des cas) dans les 6 semaines post vaccination.

L'incidence de cette complication neurologique sévère (6.6 per 10,000,000) est supérieure au taux attendu dans la population générale et aussi plus élevée qu'après Menactra ou après vaccination antigrippale.

Souayah N, et Al. Guillain-Barré syndrome after Gardasil vaccination: data from Vaccine Adverse Event Reporting System 2006-2009. *Vaccine*. 2011 Jan 29;29(5):886-9.



◀ **Un risque augmenté de SGB après vaccination anti-HPV a été mis en évidence dans notre étude.** Ce résultat paraît robuste au regard des résultats des analyses de sensibilité et en sous-groupes prévus au protocole

Le calvaire de Marie Océane Bourguignon

De Mila Ta Ninga Lundi 25 novembre 2013 par France Bleu Gascogne , France Bleu Gironde , France Bleu Pays Basque

Elle a été hospitalisée une première fois à Dax pour des vertiges et des vomissements, puis au CHU de Bordeaux, suite à des pertes de la vue, de la marche et d'une paralysie faciale .



« Je dors tout le temps, je suis fatiguée, j'ai des vertiges en permanence, la concentration : je n'en ai pas du tout, j'ai du mal à marcher. J'ai juste envie qu'on

Gardasil et insuffisance ovarienne prématurée

La première étude significative reliant l'insuffisance ovarienne prématurée au vaccin Gardasil a été publiée en 2020 et a identifié un nombre disproportionné de rapports d'événements indésirables liés au vaccin dont l'insuffisance ovarienne prématurée et une ménopause prématurée.

Une étude de suivi a été publiée en mars 2022 dans *Drugs Real World Outcomes*. Cette étude a également conclu qu'il existait une association potentielle entre l'insuffisance ovarienne prématurée et le vaccin contre le VPH.



Le syndrome d'intolérance orthostatique (ASIA)

une analyse rétrospective réalisée au Danemark sur 53 patients développant une intolérance orthostatique et d'autres symptômes compatibles avec un dysfonctionnement autonome dans les deux mois suivant la vaccination quadrivalente contre le VPH .

Les auteurs ont indiqué un schéma reconnaissable de symptômes somatoformes (maux de tête, douleurs neuropathiques localisées ou diffuses, troubles dysautonomiques, fatigue excessive et dysfonctionnements cognitifs), dans lesquels différentes entités cliniques, à savoir le POTS, le SDRC, la fibromyalgie et le SFC, pourraient être incluses. L'ASIA pourrait être le diagnostic incluant tous ces syndromes,



The Vaccinated Girls – Sick and Betrayed. Quelques victimes danoises du Gardasil



Now for the first time, several doctors
express their concerns -

TV2 Denmark Documentary on HPV Vaccine Shows Lives of Young Women Ruined

Ces manifestations témoignent des complications du Gardasil

On ne peut pas traiter ces manifestantes d'antivax puisqu'elles ont fait confiance au annonces gouvernementales prônant le Gardasil dont elles ont été victimes



Colombie



Ces japonaises aussi !



Irlande 450 filles victimes oubliées du vaccin Gardasil

Victimes US du Gardasil réclamant justice

- A ce jour, des centaines de jeunes américaines ont été victimes des vaccins HPV
- Plusieurs cas d'accidents mortels ont été reconnus par les justices comme conséquences de la vaccination anti HPV
- Aux USA les vaccins HPV représentent plus de la moitié des indemnisations pour accidents vaccinaux
- La justice américaine a **déclaré recevable deux procès fédéraux regroupant en class actions** près d'une centaine de plaintes



Ces jeunes américaines réclament justice !

Balance avantage/risques négative


Le bénéfice du Gardasil est incertain et possiblement négatif et ses risques sont prouvés alors que le dépistage cytologique est sans risque et son efficacité formellement démontrée.

Pourquoi consacrer tant d'efforts et d'argent à une vaccination qui n'a pas prouvé son utilité anti cancéreuse alors que nos finances sont au plus bas?

En France, le cancer du col de l'utérus est une maladie rare dont le taux de mortalité est plusieurs fois inférieurs au taux d'effets indésirables graves signalés (y compris les décès) liés à la vaccination contre le VPH.

Tomljenovic L , Shaw CA. Politique vaccinale contre le virus du papillome humain (VPH) et médecine factuelle : sont-elles en contradiction ? Ann Med 2011 . est ce que je: 10.3109/07853890.2011.645353



Informez-vous



Dr Nicole Delépine
Dr Gérard Delépine

Gardasil

Faith and propaganda
versus hard evidence



Nous refusons la vaccination anti HPV parce qu'elle est dangereuse et qu'elle augmente le risque de cancer du col !

Quel conseil pour les jeunes filles déjà vaccinées ?

1°) **Ne pas paniquer** Si le vaccin augmente le risque de cancer celui-ci reste heureusement très faible (incidence annuelle de quelques cent millièmes)

2°) Se rappeler que **ce cancer est prévenu efficacement par le dépistage cytologique**

3°) **Donc se faire dépister par les frottis** (sans tests HPV) comme d'ailleurs le signale la notice du vaccin rédigée par les laboratoires.

4°) Les courbes des registres du cancer suggèrent que le vaccin accélère l'histoire naturelle; il est donc préférable **après vaccin de se faire dépister tous les deux ans** (Comme le conseille d'ailleurs J. Dillner, apôtre suédois du vaccin après qu'il ait reconnu l'évolution défavorable de l'incidence chez les vaccinées).